

Sort Azərbaycan Elmi – Tədqiqat Tərəvəzçilik İnstitutunda Cito x 5 (Qaratağ 256 x L. Humbolti Mill) çarpazlaşdırılmasından alınmışdır. 2010 – cu ildə respublikada rayonlaşdırılmışdır.

Sort tezyetişəndir, ilk meyvələr yetişənə qədər 89-105 gün keçir. Meyvəsi uzunsov, oval, səthi hamar, yetişməmiş meyvənin rəngi ağımtıl – yaşıl, yetişmiş meyvənin rəngi qırmızı, toxum yuvası düzgün olmaqla, yuvaların sayı 2-3-dür. Sort 100 % yekcinsdir.



Hektardan ümumi məhsuldarlıq illər üzrə 500-650 s/ha, əmtəəlik məhsul 450-600 s/ha-dır. Meyvənin çəkisi 95,5-105,5 q-dır. Meyvədə quru maddənin miqdarı 7,5-8,5 %, şəkər 2,5-2,8 %, vitamin C 25,5-30,6 mq %-dir.

Birgə məhsulvermə qabiliyyətinə malik olmaqla, xəstəliyə, abiotik amillərə, nəqliyyata, saxlanmağa orta davamlıdır. Sort konserv sənayesində istifadə üçün yararlıdır.



Pomidor bitkisinin gövdəsi dikduran və yerə sərilən olub, uzunluğu 3m-ə çatır. Yarpağı adi, ştamblı və kartof yarpağı kimi olub, kənarı tam və ya lələkvari kəsiklidir. Çiçəkləri salxım formasındadır və yarpaq qoltuğundan əmələ gəlir. Onlan əsasən ikicinsli, az hallarda bircinslidir, yaşılımtıl-sarı rənglidir. Meyvəsi giləmeyvədir. İriliyi 1 qramdan, 900q-a qədər, müxtəlif formalarda və rənglərdə olur.

Pomidor istilik və işıqsevən bitkidir. Bitkilərin normal boy inkişafı üçün 22⁰-24⁰C temperatur tələb olunur. Çox vaxt 15⁰C və daha aşağı temperaturda çiçəklənmə, 10⁰C və daha aşağı temperaturda isə böyümə prosesləri dayanır. 35⁰C-dən yüksək temperaturda, bitkilərin boy və

inkişafı zəifləyir. Bitki üçün torpağın optimal nəmliyi 75-80% hesab edilir. Pomidor mexaniki tərkibcə yüngül torpaqlarda yaxşı becərilir. Çiçəkləmədən 35-40 gün sonra məhsulu yığılır.

Pomidor bitkisi üçün ən yaxşı sələf bitkiləri – xiyar, digər bostan bitkiləri, soğan, paxlalar, kələm hesab edilir. Bu bitki üçün mexaniki tərkibcə yüngül, qumsal torpaqlar daha əlverişlidir. Respublikanın tərəvəzçilik bölgələrində şitillər əsasən parniklərdə və polietilen örtüklü istixanalarda 35–40 gün ərzində becərilir. Bölgələrin iqlim şəraitindən asılı olaraq əkin üçün hazır olan şitillər may ayının ortalarından axırına qədər olan müddətdə açıq sahədə 70 x 35 sm sxemi üzrə əkilir. Bitkiyə qulluq işləri əsasən cərgə və bitki aralarının becərilməsi, alaqların vurulması, gübrələrin verilməsi, suvarılması, xəstəlik və zərərvericilərə qarşı mübarizədən ibarətdir.



Vegetasiya müddətində 2-3 dəfə kultivasiya çəkilməli, bitki araları 4-5 dəfə alaqdan təmizlənilib, yumşaldılmalı və bitkinin boğazı doldurulmalıdır. Bitkiyə 1 dəfə yemləmə əkildikdən 10-12 gün sonra, 2-ci yemləmə isə meyvə əmələ gəlmə zamanı verilməlidir.



Sortun toxumçuluq işi pomidorun ilkin və reproduksiya toxumçuluğuna aid metodik göstərişlər tələblərinə uyğun icra edilir.

Pomidor toxumları səpindən 4-5 gün əvvəl 5%-li xörək duzu məhlulunda ağırlığına görə seçilməli, təmiz su ilə yuyularaq qurudulmalıdır. Səpilən toxumun əkin keyfiyyəti ən azı 96-98% olmalıdır.

Cücərtilər əmələ gəldikdən sonra şitillikdə havanın temperaturu 4-5 gün müddətində 13-16°C, sonralar isə 20-22°C həddində saxlanılır. Əkinə 3-5 gün qalmış şitillik daim havalandırılır.

Meyvədə toxumun miqdarı ortadır və 1000 ədəd toxumun çəkisi 3 qramdır. 1 ton meyvədən 3,0 – 3,5 kq toxum istehsal olunur. Sortun toxumları adi şəraitdə cücərmə qabiliyyətini 3 – 5 il saxlaya bilir.



*Azərbaycan Respublikası
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi
Tərəvəzçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutu*



**Pomidor
YUBİLEY-60
sortu**